Giza Fisiologia. Laborategiko praktikak

Leire Iparraguirre, Lara Rodriguez, June Olazar, Ane Portillo eta Aitziber Velado

Taupada maiztasuna

Taldeko hiruk 75 taupada/min-ko izan zuten, beste batek 95 taupada/min eta 58 taupada/min azkenak. Beraz, normala den tartean sartzen dira bost emaitzak, nahiz eta taldearen barnean aldakortasuna egon.

Erritmoa

Sinusala da, pultsuen arteko distantzia konstantea delako kasu guztietan.

Uhin eta tarteen ezaugarrien azterketa



P-R tartea aztertu da, eta hortik, nodo aurikularrak bentrikulua betetzeko behar duen denbora kalkulatu da. Kasu guztietan 0,12-0,16s artean eman du, beraz, balio normalen artean daude bost emaitzak.

Bihotz-ardatza

Kasu guztietan behera eta ezkerrera atera den arren, angelua aldatu da batetik bestera. Bi adibide jarri ditugu:





Bihotz auskultazioa eta presio arteriala

Bihotz auskultazioa eta presio arteriala normalak izan dira kasu guztietan. Presio sistolikoan 120 mmHg-tik beherako eta diastolikoan 80 mmHg-tik beherako emaitzak lortu ditugu (110 mmHg eta 60 mmHg inguru).

Espirometria

Ez genuen lortu espirometroak baliorik ematerik, eta, beraz, ez dugu daturik kalkuluak ateratzeko.